縣下に豚コレラ

食欲なく豚舎の隅にうずくまる

発生後二・三日で死亡

新潟市周辺に豚コレラ保健畑生所から中浦家畜市によると、西浦原部内町の豚コレラは県畜産課の調査で発生は初発は新潟市周辺、特に山の下方面らしく、六月初旬より発生しているものが届出がないため今まで処置がなかった結果であるといわれる。

豚コレラの病性は極めて激烈であり、一度発生を見ては愛処分以外に処置がない。極力早期に発見し被害を最小限に止める必要がある。豚飼育者は早期発見と届出の勧行に協力願いたい。

豚コレラの症状発生の通り。

(1) 病状は、大部分が急性の経過をとり、一、二日で死亡するものもあり、一週間と二〇日位で死ぬものもある。急に食欲がなくなり豚舎の隅にうずくまるか、(嗅)中にぐったり、後ずさりし、一週間と二〇日位で死ぬものもある。

(2) 発生後二・三日で死亡する。

(3) 一度発生を見ては愛処分以外に処置がない。

(4) 発病後一～三日で死亡するものもあり、一～二〇日位で死ぬものもある。

(5) 体温は四一～四二度が続くが死が近づくと下降するものが普通であり、呼吸は促迫する。

(6) 皮膚に点状出血が大不規則な紫赤色の出血ハ

(7) 消化器は初期は食欲減退し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(8) 体温は四一～四二度が続くが死が近づくと下降するものが普通であり、呼吸は促迫する。

(9) 皮膚に点状出血が大不規則な紫赤色の出血ハ

(10) 消化器は初期は食欲減退し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(11) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(12) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(13) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(14) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(15) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(16) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(17) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(18) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(19) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(20) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(21) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(22) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(23) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(24) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(25) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(26) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(27) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(28) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(29) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。

(30) 粘膜は充血し水腫又は腹水が盛んに水をのみ初期には往々嘔吐する。