


## 成人病住民検診対象者

(35~64歳までの健康者)

対象  
(35~64歳)  
11,194人1次検診  
血压測定  
9,005人2次検診  
(精密検査)  
315人尿検査  
1,527人健 康 者  
(年1回)  
異常なし  
再検査  
受診勧奨未受診  
48人

## 脳卒中後遺症者の発症時年齢区分

年 次	50歳未満	50~60歳	60歳以上	計
45年	5人	11人	42人	58人
47年	7	12	34	53
48年	5	4	37	46



左の図でもわかるとおり三十五歳から六十四歳までの健  
康者、つまり検診対象者は、市内で一万一千九十四人は  
どおられます。そして九千五  
人のかたたちが昨年市が行な  
った住民検診を受けられま  
した。

このうち精密検査を必要と  
するかたが三百十五人もお  
ります。昨年はじめて卒中で倒れた  
人たち、一年間で八十八名  
おりました。うち四十二名が  
死亡されました。十六名のかたたちは、下の表

の過去の年次区分のとおり、  
若年層の卒中発作の年齢が伸び  
てきているのがわかります。  
つまり、六十歳の働き盛  
りでは、わずかながらも少  
なくなっているというよい結  
果がみられたものです。  
こんどは、左下のグラフを

見てください。この四十六名  
の発病前の受療状況では、治  
療が必要にもかかわらず薬を  
のんだり、のまなかつたりす  
る人(不規則治療者)の中か  
ら、半数に近い人が発作を起  
こしていくことがうかがわれ  
ました。

これらの成人病——高血圧  
は、自覚症状はありませんので、自己判断で治療をやめた  
り健康に自信があって、血圧  
を気にしない人が多くいま  
す。高血圧——そく脳卒中と  
結びつけることは早計ですが  
起こしやすいことは事実で  
す。キッカケをつくらないよ  
う日常生活に工夫をこらして、  
医師の適切な指示を受けて万  
全な予防につとめたいもので  
す。

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人 24%

48年中の中の脳卒中(新発生者) 46人

不規則治療者 21.7%

高血圧にて気付いていた人 19.6%

無自覚者 15.1%

不明 19.6%

治療を経続していた人