


情報公開制度審議会が初会合 住民の知る権利を明確化 62年4月スタートを目指す



4月28日に情報公開制度審議会の初会合が開かれました

「新潟市情報公開制度審議会」は、住民の知る権利を明確化することにより、行政が住民の第一回会合が四月二十二日、イタリヤ軒で開かれ、若杉市長が市の情報公開制度について諮問した。同審議会は各界から委嘱した七人で構成され、会長に吉田泰壽日産社長相談役を選出する。この諮問を受け、同審議会は、住民の知る権利を明確化することにより、行政が住民の第一回会合が四月二十二日、イタリヤ軒で開かれ、若杉市長が市の情報公開制度について諮問した。同審議会は、各界から委嘱した七人で構成され、会長に吉田泰壽日産社長相談役を選出する。この諮問を受け、同審議会は、

国民健康保険 納入通知書を 郵送します

五十九年中の所得に基づいて計算された国民健康保険料の納入通知書を、今月上旬に郵送します。この保険料は、六十一年中の所得に基づいて五月に再計算（保険料の確定）するまでの暫定の額です。保険料の計算方法を詳しくは、納入通知書に同封のパンフレット「わたしたちの国民健康保険」をご覧ください。

修正の申し出方法は、修正の申し出を土地や建物などを売却して得た譲渡所得は、税金がかかる場合でも保険料の計算の対象となります。六十一年中に譲渡所得のある方は、修正の申し出をされるようお勧めします。修正の申し出により、年間の各納期に保険料が均等化され納しやすくなります。

納入通知書を受けた日から三十日以内に六十一年中の所得が分かる資料（所得税・住民税の申告書の控え、源泉徴収票など）、印鑑、納入通知書を持参のうえ、国民健康保険課においで下さい。国民健康保険課（本庁舎五階、内線三八八三、八九番）へ



健康第一、元気に遊ぶ子供たち

健康の指標に快便があげられます。最近では水浴トイレが普及し、簡便な自分自身の便を見ることもできます。消化器系の病は、大便秘結されるものも多く、肛門（こうもん）からの出血を、取りまとめた素案を今回設置された審議会に諮ったのです。素案は全十七条で、①情報公開制度を施行している地方自治体は、まだ少ないながら、全国的な風潮をたどっており、多くの地方自治体で制度が研究されています。本市では、五十九年から取組み、庁内に「情報公開準備調査研究班」を設け、制度化について検討を行い、報告書をまとめた。

さらに、市民各層で構成された「情報公開推進懇談会」を設け、五十九年一月に提言をいただきました。この提言を基に、全庁的なプロジェクトチームを発足させ、素案の作成作業に入りました。

本年三月末の地方税法改正に伴い、市税条例の一部が改正され、四月一日から施行されます。改正の主な内容は、市税条例の一部が改正され、四月一日から施行されます。

市税条例の一部改正
非課税基準額を引き上げ
審議会委員は各界から

市美術館「えほんのえ展」
子供たちに楽しいプレゼント
4日、5日

条例素案は17条

健康の指標に快便があげられます。最近では水浴トイレが普及し、簡便な自分自身の便を見ることもできます。消化器系の病は、大便秘結されるものも多く、肛門（こうもん）からの出血を、取りまとめた素案を今回設置された審議会に諮ったのです。素案は全十七条で、①情報公開制度を施行している地方自治体は、まだ少ないながら、全国的な風潮をたどっており、多くの地方自治体で制度が研究されています。本市では、五十九年から取組み、庁内に「情報公開準備調査研究班」を設け、制度化について検討を行い、報告書をまとめた。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。

下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。下部消化管では肛門に近い位置に付着しているときは、周囲に付着しているときは、痔（じ）出血の場合が多いです。